

高い真菌消失率が確認されています

臨床成績

方 法

口腔カンジダ症患者に、フロリードゲル経口用2%1日10～20gを4回（毎食後及び就寝前）に分け、原則として10日～2週間投与した。

（用法・用量に関連する使用上の注意）
本剤の投与期間は原則として14日間とする。
なお、本剤を7日間投与しても症状の改善が見られない場合には本剤の投与を中止し、他の適切な療法に切り替えること。

【引用文献】

- 1) 蝶良英郎 他：Jpn. J. Antibiot. 44 (3), 324～336 (1991)
- 2) 蝶良英郎 他：医学のあゆみ 157 (6), 385～395 (1991)
- 3) 太田宗夫 他：救急医学 16 (1), 109～113 (1992)

投与終了時に病原真菌の有無を直接鏡検および培養検査により確認した結果、口腔カンジダ症で80.2%の患者に真菌消失を認めた。



口腔カンジダ症
(n=111)

- 4) 冲津光久 他：日本口腔科学会雑誌 40 (3), 568～573 (1991)
- 5) 王 伯銘 他：新薬と臨床 40 (3), 532～533 (1991)
- 6) 白戸りさ 他：化学療法の領域 7 (6), 1160～1164 (1991)

効果的な使い方

1

- まず、うがいをして口の中を清潔にしてください。
- キャップ先端のとがった部分でチューブに穴をあけてください。




2

主治医から指示されたお薬の1回量を清潔な専用スプーンにとります。




使用後はチューブのキャップをしっかりと締めて保管してください。

〈2.5g計量の場合〉



〈5g計量の場合〉



3

お薬を口に含みます。
お薬の量が多い場合は、少しずつ分けて口に含むようにしてください。



4

- お薬を含んだら、舌でまんべんなく口の中に塗りひろげてください。
- この状態で、できるだけ長く口の中に含んだあと飲み込んでください。
- 入れ歯の方は、よく洗浄して入れ歯にも少しお薬を付けましょう。



5

- 使用後のスプーンはよく洗浄し、清潔に保管してください。
- 服用後、少なくとも1時間位は、うがい、歯みがき、飲食をしないようにしてください。

